


ESTRANGULAMIENTO

Signos Visibles



Recientemente el estrangulamiento ha sido identificado como una de las formas más letales de la violencia doméstica: el estado de inconsciencia puede ocurrir en cuestión de segundos y la muerte en cuestión de minutos. Cuando los agresores estrangulan a sus víctimas, no sólo se trata de una agresión criminal, sino, de un intento de homicidio. El estrangulamiento es una forma extrema de poder y control, en la que el agresor demuestra control sobre la respiración de la víctima; lo cual tiene efectos psicológicos devastadores o potencialmente un desenlace fatal.

Lo primero que sentirán las víctimas de estrangulamiento, sobrias y conscientes, será terror y dolor severo. Si el estrangulamiento persiste, seguirá la pérdida del conocimiento. Antes de caer en estado inconsciente, una víctima de estrangulamiento por lo general se resistirá de forma violenta, lo que a menudo producirá lesiones en su propio cuello en un intento por arrancar las manos del agresor y con frecuencia, también se causarán lesiones en la cara o en las manos de su agresor. Estas lesiones defensivas pueden no estar presentes si la víctima fue sometida física o químicamente antes de la agresión.

Observando Cambios

Es muy útil elaborar un diario de evidencia física por medio de documentación de fotografías en secuencia por un período de días después de la agresión.

Las víctimas también deben buscar atención médica si tienen dificultad al respirar, hablar, tragar o si sufren náusea, vómito, mareo, dolor de cabeza y/o defecan u orinan involuntariamente, especialmente las víctimas embarazadas. Una evaluación médica puede ser crucial en la detección de lesiones internas y salvar la vida.

Pérdida de Consciencia

Las víctimas pueden perder la conciencia por uno o todos los siguientes métodos: bloqueo de las arterias carótidas en el cuello (privar al cerebro de oxígeno), el bloqueo de las venas yugulares (evitando que la sangre desoxigenada salga del cerebro), y el cierre de la vía respiratoria, lo que hace imposible la respiración.



Signos y Síntomas Adicionales

Una versión más grande del gráfico anterior que contiene signos y síntomas detallados está disponible para descarga en <https://www.familyjusticecenter.org/resources/signs-and-symptoms-of-strangulation/>

Este proyecto cuenta con el apoyo total o parcial del subsidio No. 2016-TA-AX-K067 otorgada por la Oficina de Violencia contra la Mujer, Departamento de Justicia de EE. UU. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación / programa / exposición son las del autor (es) y no reflejan necesariamente la opinión de la Oficina de Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia.

La impresión de este proyecto está fundado por subsidio número 20-VOCA-46 otorgado a través del acuerdo Federal para Víctimas de Crimen, administrado del programa de subsidio del Gobernador de Kansas. Las opiniones, descubrimientos y conclusiones o recomendaciones expresadas son del autor y no necesariamente refleja el punto de vista de la oficina del Gobernador o el Departamento de Justicia de E.U. Departamento. Este programa no discrimina en base de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.



Un programa de

ALLIANCE for
HOPE
INTERNATIONAL

strangulationtraininginstitute.com

Ilustraciones y Diseño Gráfico por Yesenia Aceves

Wichita Police Department

455 N. Main
Wichita, KS 67202

316-268-4156

www.wichitapolice.com

Información que Víctimas
del Estrangulamiento
Necesitan Saber

Documenta tus SIGNOS

Fecha y
Hora

Anota tus signos

Documenta tus SÍNTOMAS

Fecha y
Hora

Anota tus síntomas

Fecha y Hora

Anota otras sensaciones

Signos de Estrangulamiento

Cabeza- puntos rojos (petequias) en el cuero cabelludo, el pelo jalado, protuberancias), fractura de cráneo, conmoción cerebral.

Cara- marcas de color rojo o enrojecida, petequias, arañazos.

Ojos y párpados- petequias en el globo ocular izquierdo o derecho, los ojos rojos con sangre.

Oído- petequias (externo o en el conducto auditivo y/o la oreja), sangrado del conducto auditivo externo.

Nariz- sangre en la nariz, la nariz rota, petequias.

Boca- moretones, inflamación de la lengua, labios hinchados, cortadas/abrasiones.

Debajo de la barbilla- enrojecimiento, arañazos, moretones, abrasiones.

Cuello- enrojecimiento, marcas de arañazos, impresiones de uñas, moretones, abrasiones, hinchazón, marcas de ligaduras.

Pecho y Hombros- enrojecimiento, marcas de arañazos, moretones, abrasiones.

Síntomas de Estrangulamiento

Cambios en la voz- voz ronca y/o ronca, tos ,incapaz de hablar, pérdida completa de voz.

Cambios de ingestión- dificultad para tragar, dolor al tragar, dolor de cuello, náuseas/vómitos, babeo.

Cambios respiratorios- dificultad para respirar, hiperventilación, incapaz de respirar.

Cambios de comportamiento- inquietud o combatividad, problemas de concentración, amnesia, agitación, alucinaciones, Síndrome de estrés post-traumático.

Cambios visuales- pérdida completa o visión en blanco y negro, viendo 'estrellas', borrosidad, oscuridad, difusa alrededor de los ojos.


Cambios auditivos- pérdida total de audición, gorgoteo, pitidos, zumbidos, presión, sonido como por un túnel.

Otros cambios- pérdida de memoria, pérdida del conocimiento, mareos, dolores de cabeza, orina o defecación involuntaria o la defecación, pérdida de fuerza, cuerpo flojo.


Diagramas para Marcar LESIONES VISIBLES

Utilice un lápiz o un marcador para indicar signos y/o síntomas visibles.

Enfrente




Bajo de la Barbilla




Lado Derecho



Lado Izquierdo



Atrás



Dentro de la Boca

